



Fipronil + (S)-Methoprene
100 mg/ml 120 mg/ml



Fipronil + (S)-Methoprene
100 mg/ml 90 mg/ml

Fibroline SM Kedi

Damlatma Çözeltisi

Fipronil + (S)-Methoprene Kombinasyonu ile,
Ergin, Larva ve Yumurtalara Karşı Tam Koruma



Pire, Kene ve Isırıcı Bitlerle Mücadelede
FIBROLINE GÜÇLENEREK GERİ DÖNDÜ !



Fibroline SM Köpek

Damlatma Çözeltisi

Fipronil + (S)-methoprene Kombinasyonu,

- Dış Parazitlerin Yaşam Döngüsünü Kırar.
- Larva ve Yumurtaların Gelişmesini Önler.



Pire, Kene ve Isırıcı Bitlerle Mücadelede
UZUN SÜRELİ KORUYUCU ETKİ



Fibroline SM Köpek

Damlatma Çözeltisi

Fipronil + (S)-Methoprene
100 mg/ml 90 mg/ml

Köpekler İçin Ektoparaziter (İnsektisit - Akarisit)

BİLEŞİMİ

Berrak Sarı renkli bir çözelti olup, her ml'de 100 mg Fipronil 90 mg (S)-Methoprene içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI

FİBROLİNE SM KÖPEK Damlatma Çözeltisi, köpeklerde aşağıdaki dış parazit enfestasyonlarının tedavi ve korunmasında kullanılır:

- Pire enfestasyonu (*Ctenocephalides canis*).

Erişkin pirelerin enfestasyonlarına karşı insektisit etkinliği 8 hafta boyunca devam eder. Aynı zamanda uygulamadan sonraki 8 hafta boyunca, erişkin pire yumurtalarının (ovisidal aktivite), larvaların ve pupaların (larvasidal aktivite) gelişmesini engelleyerek pirelerin çoğalmasını önler.

- Kene enfestasyonu (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). Kene türüne göre değişmekle birlikte, dört haftaya kadar süreyle kalıcı akarisit etki gösterir.

- Isırıcı bit enfestasyonu (*Trichodectes canis*).

Pire Alerjik Dermatitisi (FAD) kontrolünde destekleyici olarak kullanılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Topikal olarak doğrudan deri üzerine uygulanır. Köpeklerde minimum antiparaziter aktif madde dozları Fipronil için 6,7 mg/kg ve (S)-Methoprene için 6 mg/kg canlı ağırlıktır. Pratik uygulama dozları köpeğin ağırlığına göre ayarlanmış olup, 0,67 ml' lik, 1,34 ml' lik, 2,68 ml' lik veya 4,02 ml' lik 1 adet tüptür.

Köpeğin Canlı Ağırlığı	Uygulanan Aktif Madde Miktarı	Tüp İçeriği	Tüp İşareti
2 - 10 kg arası	67 mg Fipronil: 60,30 mg (S)-Methoprene	0,67 ml	S
10 - 20 kg arası	134 mg Fipronil: 120,60 mg (S)-Methoprene	1,34 ml	M
20 - 40 kg arası	268 mg Fipronil: 241,20 mg (S)-Methoprene	2,68 ml	L
40 - 60 kg arası	402 mg Fipronil: 361,80 mg (S)-Methoprene	4,02 ml	XL

Uygulama Yolu: Tüp dik olarak tutulur ve kapak çevrilerek açılır. Köpeklerde iki omuz arasındaki boynun başlangıç bölgesinde bulunan tüyler, derisi görülecek şekilde ayırılır. Tüp deri üzerine yerleştirilip birkaç kez hafifçe sıkılarak, içerik deri üzerine tek bir leke halinde tamamen boşaltılır.

İSTENMEYEN YAN ETKİLER

Uygulama bölgesinde çok seyrek, geçici deri reaksiyonları (deride renk kaybı, lokal tüy dökülmesi, kaşıntı, kızarıklık) ve genel bir kaşıntı veya tüy dökülmesi şekillendiği bildirilmiştir. Kullanımdan sonra aşırı salivasyon, reverzibl nörolojik semptomlar (hiperestezi, depresyon ataksi ve tremör gibi sinirsel semptomlar) veya kusma görülebildiği bildirilmiştir. Hayvan ilaçlı bölgeyi yaladığı takdirde kısa süreli hipersalivasyon (aşırı salya akıntısı) şekillenebilir. Doz aşımı yapmayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajında, 25°C'nin altında oda sıcaklığında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, alevden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

GİDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI: İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.); Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

1, 3 ve 6 adet 0,67 ml-1,34 ml-2,68 ml-4,02 ml ürün içeren blister ambalajlı; polyfoil PE tüpler veya termoform olarak şekillendirilmiş şeffaf film (PP-Koeks-HDPE) ve beyaz folyodan (PET-AL-HDPE) oluşan pipetler karton kutularda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle; eczane, veteriner muayenehaneleri ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİNİ TARİHİ VE NO: 24.09.2019 - 028/0073

PAZARLAMA İZİNİ SAHİBİ ADI VE ADRESİ

BAVET İlaç San.ve Tic. A.Ş.

İTOSB (İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi) 12. Cad. No: 8 34959

Tepeören - Tuzla / İstanbul www.bavet.com.tr - info@bavet.com.tr

Fibroline SM Kedi

Damlatma Çözeltisi

Fipronil + (S)-Methoprene
100 mg/ml 120 mg/ml

Kediler İçin Ektoparaziter (İnsektisit - Akarisit)

BİLEŞİMİ

Berrak Sarı renkli bir çözelti olup, her ml'de 100 mg Fipronil 120 mg (S)-Methoprene içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI

FİBROLİNE SM KEDI Damlatma Çözeltisi, kedilerde aşağıdaki dış parazit enfestasyonlarının tedavi ve korunmasında kullanılır:

- Pirelerin eliminasyonu (*Ctenocephalides spp.*).

Erişkin pirelerin enfestasyonlarına karşı insektisit etkinliği 4 hafta boyunca devam eder. Aynı zamanda çevre koşullarına ve enfestasyon düzeyine bağlı olarak uygulamadan sonraki 6 hafta boyunca, erişkin pire yumurtalarının (ovisidal aktivite), larvaların ve pupaların (larvasidal aktivite) gelişmesini engelleyerek pirelerin çoğalmasını önler.

- Kenelerin eliminasyonu (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). Kene türüne göre değişmekle birlikte, iki haftaya kadar süreyle kalıcı akarisit etki gösterir.

- Isırıcı bitlerin eliminasyonu (*Felicola subrostratus*).

Pire Alerjik Dermatitisi (FAD) kontrolünde destekleyici olarak kullanılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Topikal olarak doğrudan deri üzerine uygulanır. Kedilerde minimum antiparaziter aktif madde dozları Fipronil için 5 mg/kg ve (S)-Methoprene için 6 mg/kg canlı ağırlıktır. Pratik uygulama dozu bu miktarların üzerinde olacak şekilde ayarlanmış olup, vücut ağırlıklarına bakılmaksızın, bütün kediler için 0,5 ml' lik 1 adet tüptür.

Uygulama Yolu: Tüp dik olarak tutulur ve kapak çevrilerek açılır. Kedilerde iki omuz arasındaki boynun başlangıç bölgesinde bulunan tüyler, derisi görülecek şekilde ayırılır. Tüp deri üzerine yerleştirilip birkaç kez hafifçe sıkılarak, içerik deri üzerine tek bir leke halinde tamamen boşaltılır.

İSTENMEYEN YAN ETKİLER

Çok seyrek de olsa uygulama bölgesinde geçici deri reaksiyonları (deride renk kaybı, lokal tüy dökülmesi, kaşıntı, kızarıklık) ve genel kaşıntı veya tüy dökülmesi şekillendiği bildirilmiştir. Kullanımdan sonra aşırı salivasyon, reverzibl nörolojik semptomlar (hiperestezi, depresyon, sinirsel semptomlar) veya kusma da görülebildiği bildirilmiştir. Hayvan ilaçlı bölgeyi yaladığı takdirde kısa süreli hipersalivasyon şekillenebilir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajında, 25°C'nin altında oda sıcaklığında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, alevden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

GİDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.); Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

1, 3 ve 6 adet 0,5 ml ürün içeren blister ambalajlı; polyfoil PE tüpler veya termoform olarak şekillendirilmiş şeffaf film (PP-Koeks-HDPE) ve beyaz folyodan (PET-AL-HDPE) oluşan pipetler karton kutularda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle; eczane, veteriner muayenehaneleri ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİNİ TARİHİ VE NO: 26.09.2019 - 028/0074

PAZARLAMA İZİNİ SAHİBİ ADI VE ADRESİ

BAVET İlaç San.ve Tic. A.Ş.

İTOSB (İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi) 12. Cad. No: 8 34959

Tepeören - Tuzla / İstanbul www.bavet.com.tr - info@bavet.com.tr

