

Çevre Sağlığı



"Türkiye'nin vektör kontrol uzmanı"



“Türkiye’nin vektör kontrol uzmanı”



BAVET, vektör kontrolü amacıyla kullanılan Biyosidal ürünlerin Halk Sağlığı ile doğrudan ilgili olduğu bilinciyle kaliteli, güvenilir ve yenilikçi ürünleri, eğitime önem veren profesyonel üstün bir hizmet anlayışıyla sunmaktadır.

BAVET, yenilikçi ve kaliteye önem veren veteriner hekimlere, veteriner sağlık teknisyenlerine, ilaçlama firmalarına (PCO), zirai ilaç toptancı ve bayiilerine, hayvancılık işletmelerine, hayvan yetiştiricilerine ve yerel yönetimlere hizmet vermeye devam etmektedir.

BAVET’in pazara sunduğu vektör kontrolünde kullanılan tüm Biyosidal ürünler Sağlık Bakanlığı Biyosidal yönetmeliğine göre (AB standartlarında) ruhsatlandırılarak piyasaya verilmektedir. Detaylı bilgi www.biyosidal.saglik.gov.tr adresinde sunulmuştur.

BAVET İlaç San. ve Tic. A.Ş. ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 Kalite Belgelerini alarak kaliteli ve yüksek standartlarda hizmet sorumluluğunu yerine getirmektedir.



ÇEVRE, EKTOPARAZİTLER (VEKTÖRLER) SAĞLIK VE KONTROL

INSEKTA(BÖCEKLER)

- Hamamböceği
- Tahtakurusu
- Sinek
- Bit
- Pire
- Karınca
- Arı
- Oribatid böcekler



Erginleri 3 çift ayaklı,

Biyoloji: Yumurta- Larva- Pupa- Ergin dönemleri vardır.

AKARLAR

- Örümcek
- Akrep
- Kene
- Uyuz
- Ev tozu akarları
- Diğer akarlar(tahıl, peynir vb)



Erginleri 4 çift ayaklı,

Biyoloji: Yumurta- Larva- Nimf- Ergin dönemleri vardır.

Günümüzde yaşam alanlarında ektoparazitlerden tamamen temiz bir ortam oluşturmak hemen hemen olanaksız görülmektedir. Gerek çevre faktörleri gerekse hedef alana ait faktörlerin bir araya gelmesi ve ektoparazitlerin göz ardı edilmesi ile birlikte insan ve hayvan sağlığı riske girmektedir. Ektoparazitlere karşı mücadele doğru teşhis ile birlikte düşünülmelidir.


Amaç minimum ilaç kullanımı ile tüm zararlı ektoparazitlere karşı maksimum fayda sağlamak ve hayvansal-bitkisel ürünler ile doğada bulunan yararlı artropodlara en az zararı vermektir. İyi bir savunma ve biyolojik temizlik için, ekto-parazit yumurta ve larvalarını tüketen yararlı artropodların ortamda bulunması önemlidir. Kimyasal mücadele en son nokta olmalıdır.

KİMYASAL KONTROL

Çevre kontrolü için uygulanan pestisitler esas olmakla birlikte bu ilaçların kullanımı ve larvasit veya ergin dönemlere etkileri iyi bilinmelidir. Özellikle kapalı veya açık alan ilaçlama prosedürü ile zamanlama en önemli kriterlerdir. Bunun yanında parazitin hangi dönemi(larva / ergin) hedef alındığı bilinerek ilaç kullanılmalıdır. Bir çok işletmede alanlarda veteriner ve zirai ilaçları çevre kontrol amacı ile kullanması sık görülen yanlıştır. Kullanılan ilaç grupları direnç görülmemesi için mutlaka 2 yılda bir değiştirilmelidir.

Kimyasal İlaç Kullanım Kriterleri;

- 1-) Hedefe yönelik olmalı (larvasit ve erginlere karşı veya repellent)
- 2-) Terapotik indeksi geniş olmalı ve su kaynaklarını kirletmemelidir.
- 3-) Ektoparazitlerin o yöreye ait mevsimsel dinamiği iyi bilinmelidir.
- 4-) Kalıntı ve biyogüvenlik normları (arınma süresi) açık ve net ifade edilmelidir.
- 5-) Kullanım zamanı, kullanım alanı (Açık/Kapalı Alan,Yüzey,Karışım) ile miktarı net belirtilmelidir.
- 6-) Kolay uygulanmalı ve tekrar kullanım gerekliliğinin olup olmadığı belirtilmelidir.
- 7-)Kalan ilaç orijinal ambalajında saklanmalıdır.



LARVA MÜCADELESİ

Larvasit uygulamalarında, uygulamanın etkisi ve devamlılığı kolayca gözlemlenebilir. Hem çevresel anlamda daha güvenli hem de uçkun mücadelesine göre maliyeti daha düşüktür.

İlaçlama Dönemi

Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte başlar. Havalar soğuyana kadar kullanılacak ürünün etki süresi dikkate alınarak düzenli aralıklarla devam eder. Genelleme yapacak olursak Mart ayı itibarı ile uygulamalara başlayabiliriz.

Su sıcaklığına göre sivrisinek yumurta, larva ve pupa dönemlerinin tamamlanarak ergin hale gelmesi yaklaşık olarak;

10 C suda 30-40 gün

20 C suda 18-20 gün

30 C suda 10-12 gün

35 C suda 7-8 gün

MÜCADELE ALANLARI

Durgun su kaynakları, bataklıklar, gübrelikler, kullanılmayan kuyular, inşaat alanlarındaki su birikintileri, durgun su kanalları, araç lastikleri, sulama havuzlar, bahçelerdeki su bidonları, saksılar vb. sulu ve nemli alanlar ilaçlanmalıdır.


Dere ve su kanallarının akışkanlığını arttırarak ilaçlanacak alanları azaltabilir, sulak alanlardaki sazları ve otları biçerek etkin bir şekilde ilaçlama yapılmasını sağlayabiliriz.

Süt ve besi çiftliklerinde gübreleri düzenli aralıklarda taşıyıp, kurutarak üreme kaynaklarını yok edebiliriz.

Mücadelenin başarılı bir şekilde sonuçlanması için uzman ve eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır.

KARASİNEK

Yumurtalarını çöplüklere, dışkıları, sıcak ve nemli alanlara bırakırlar. Her dişi 3-4 haftalık yaşamı boyunca 367-600 yumurta yumurtlar. Bir çift sinek Nisan ayında üremeye başladığında ve yumurtaların tümünün hayatta kaldığı var sayıldığında Ağustos ayında sonuç; $191, \times 10^{18}$ sinek olur. Mekanik bulaştırıcı olarak görev yaparlar. Sadece Dermatobia hominis'in biyolojik vektörüdürler. Yaklaşık 300 patojeni insan ve hayvanlara bulaştırırlar. Karasinekle bulaşan hastalıklar; Helminth, Protozoon, Virus, Bakteri, Mantar, Avian Influenza, Şap virüsü, infeksiyöz hepatitis, Enterovirus, Poliomyelitis, Infectious bovine keratoconjunctivitis, myxomatosis, Escherichia, Salmonella, Vibrio, Antrax, Corynebacterium, Streptococcus, Mycobacterium, Staphylococcus, bakteriyel conjunctivitis, Cryptosporidium, Giardia, Entamoeba, Toxoplasma, Trypanosoma, Coccidiosis, Trichuris, Seteria, Habronema, Paraflaria Dermatobia




SU VE VEKTÖR KAYNAKLI HASTALIKLAR GELECEKTEKİ EN ÖNEMLİ DOĞAL AFETTİR



SİVRİSİNEK

Bu ailede yaklaşık 3500 tür vardır. Aquatikler, Ergin dişi sivrisinekler beslenmek için kan emerler. Erkekler kan emmezler. Yumurtalarını durgun sular, süs havuzları, içi su dolmuş araba lastikleri, su kovaları, saksı altlıkları, banyolardaki ıslak alanlar gibi su bulunan noktalara bırakırlar. Ömürleri Dişilerde genellikle 6 ila 8 hafta, erkeklerde 10 gündür. Bu süreçte 3 kez yumurtlar ve 22-30 °C ısı ve uygun nem ortamında tek bir seferde 300 yumurta bırakabilir. Yaklaşık 1500 patojeni insan ve hayvanlara bulaştırırlar. Virus, protozoon, helmint ve riketsiaları taşırlar. West Nile, Rift vadisi humması, Dang humması, Chikungunya, Zika, Enseflomyelit etkenleri, Malaria, Fliariose etkenleri, 100'e yakın Arbovirus etkenini bulaştırırlar. Sadece 2010 yılı verilerine göre 225 milyon insan Malaria ile bulaşık olup yılda 800 bin insan bu hastalıktan ölmektedir. 128 milyon kişi de Fliariose ile enfektidir.




BİR SİVRİSİNEK 1 GECEDE 1KM UÇAR VE EN AZ 6 DEFA KAN EMMEKZORUNDADIR . SİNEKLER İNSAN VE HAYVALARA 1500 PATOJENİ BULAŞTIRIR.

KIŞIN DÖLLENMİŞ VE DİAPOZDA BEKLEYEN 1 DIŞI SİVRİSİNEK MAYIS AYINDA 1 MİLYON UÇKUN SİNEĞİN ANNESİDİR

HAMAM BÖCEĞİ

Beş ailede yaklaşık 4000 türü kapsar. Hamam böcekleri genel olarak sıcak ve nemli ortamları severler. Mutfaklar ve gıda malzemeleri üretimi ya da satışı yapan işyerleri hamam böceği için en ideal ortamlardır. Nişastalı yiyecekler, tatlılar, et, kitap sayfaları, dökülen saç, deri döküntüleri başlıca beslenme kaynaklarıdır. Aç bir hamam böceği aylarca yaşarken, su olmadan sadece 1 hafta dayanabilirler. Dizanteri, ishal, cüzzam, veba ve gıda kaynaklı bakteriyel kontaminasyon (Bacillus subtilis, Escherichia coli, Salmonella typhi) gibi bulaşıcı hastalıkları taşırlar. Ayrıca hepatitis yayılımı ile doğru orantı bulunmuştur. Protozoonlardan Toxoplasma gondii, Balantidium coli, Entamoeba histolytica ve Giardia intestinalis'in bulaşımında rol oynar. Hamam böceği allerjisi tüm dünyada yaygın olup astımlı bireylerin %50, sağlıklı bireylerin %10'unda görülmektedir. Bir apartman veya işletmede bir noktada görülmeleri tüm ortamın kontrol altına alınmasını gerektirir.



EKTOPARAZİTLER 12 °C İLE 34 °C ARASI AKTİFTİR. İDEAL 22-26 °C VE %70 NİSPİ NEM EN İYİ ÜREME ORTAMLARIDIR.


PİRELER

Pireler 15 aileye bağlı 244 soyda 2600 türü kapsamaktadır. % 94'ü memelilerde, %6'sı kanatlılarda parazitlenir. Siyah, kahverengi, kızılımsı tonlarındadır. Boyları 1,5 - 4 mm arası değişiklik gösterebilir. Hızlı hareket özelliğine sahip, sıçrama (60-70cm yukarı, 20cm yana) ve emici potansiyeli bir hayli yüksek zararlı canlılardır. Kanı kırmızı olan tüm canlılardan beslenebilirler, tür spesifitesi zayıftır. Pireler yüksek üreme gücüne sahiptirler. Yılın her ayında gözlemlenebilen, genelde uygun ortamı bulduklarında 7 ila 11 gün içinde evrimleşerek yumurtaların aynı anda patlamasıyla etrafa yayılabilirler. Pirelerin genelde yaşam alanları tozlu ve hayvanların bulunduğu sağlıksız koşullardır. Özellikle pire allerjileri ve dermatitis sıklıkla görülür (insan, kedi, köpek). Q Humması, Tifüs, Veba, Alerjik ve Cilt hastalıkları, Barsak kurdu, Bağırsak şeridi, Riketsia, Coxiella, tenya etkenleri gibi birçok hastalığı bulaştırabilirler. FAD; (Flea Allergy Dermatitis) Tip 1 = Çabuk tip, Tip 4= gecikmiş tip allerji oldukça yaygın olarak görülür.

PİRELERDE HEDEF, SADECE HAYVAN DEĞİL, ALAN SAVUNMASIDIR.

%5 ERİŞKİN
%10 PUPA
%35 LARVA
%50 YUMURTA

ALANDA ANCAK OLGUNLARINI GÖREBİLİRSİNİZ




FARELER

Memeli hayvan türlerinin % 40'ını kemirgenler oluşturur. Günışığından hoşlanmazlar. İştih ve koku duyuları çok keskindir. Renkleri ayırt edemezler. Günde 12 saatten fazla uyurlar. İyi bir yüzücü ve koşucudur. Sıcak ülkelerde ya da ısıtılan ortamlarda ev faresinin üremesi mevsimlere bağlı değildir. Tarlalara, ambarlara ve evlere dadanarak insanın besin kaynaklarına ortak olurlar. Fare ve sıçanlar genel olarak her türlü gıda maddesi ile beslenirler. Bununla beraber, karbonhidrat ve proteince zengin olanları tercih ederler. Buğday, mısır, fasulye, patates, ekmek, un, hayvan yemi, yaş meyveler, sebzeler, et, şeker, çiçek soğanı ve peynir gibi gıdaları severler ve hatta bazen yaralı olan hemcinslerini dahi yerler.

Her çeşit gıdaları kemiren, Poliomyelitis, Tifo, Tularemi, Dizanteri, Kuduz, Hantavirüs, Tifüs, Leptospiroz, Weil hastalığı ve Veba gibi salgın hastalıkları taşıyabilen önemli zararlılardır. Hastalığa tutulmuş farelerin üzerinde bulunan pireler hastalığı almakta ve insanlara bulaştırmaktadırlar. Özellikle Veba salgınlarında farelerin çok büyük rolü olmaktadır. XIV. asırda Avrupa'da 25 milyondan fazla insan Veba yüzünden ölmüştür.

WHO yılda farelerin tükettiği pirinç ve buğdaygillerin 33 milyon ton olduğunu bildirmesine karşın bu ürünlere verdiği zararın 5-10 katı bulunduğunu tespit edilmiştir.




KENELER

Yaklaşık 900 civarı türü olduğu bilinen keneler kan emerek beslenir, Mera ve Ahır keneleri olarak ayrılırlar. Mera Keneleri konaklarına tutunup ağız organellerini deri içine sokarlar ve burada sabitlenip doyana kadar aynı yerden kan emerler. Erkek ve dişiler kan emme esnasında çiftleşirler. Ahır keneleri ise zaman zaman gelip kan emip çatlaklarda saklanırlar. Dişi keneler yumurtalarını taş, toprak, çatlak ve merada yaprakların altına, toplu ve birbirine yapışık şekilde bırakırlar. Sineklerden sonra en fazla insan ve hayvanlara hastalığı bulaştırırlar. Bakteri, Protozoon, Helmint Virüs ve Riketsiaları insan ve hayvanlara naklederler.

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, Lyme Hastalığı ve Keneler

Lyme Hastalığı, bakteriyel bir hastalık olup insan ve hayvanlarda ormanlık ve yağışlı bölgelerde Ixodes spp. cinsi kenelerle bulaşır. KKKA(Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) ile kenelerin ilişkisi ilk defa 1940'lı yıllarında Kırım'da hasat toplayan çiftçilere yardım eden askerlerde hastalığın oluşması ve etkenin kenelerden izole edilmesi sonucunda önem kazanmıştır. Kenenin tam anlamı ile vektör kabul edilebilmesi için, etken izolasyonu dışında, kenenin virüse duyarlı hayvanlara aktarabilme ve viremik hayvanlardan alabilme yeteneğinin de olması gerekmektedir. Sığır gibi hayvanlarda viremi 10 gün kadar devam eder, ancak subklinik seyreder. Ülkemizde Hyalomma marginatum H.rufipes ve H.anatolicum, Dermacentor marginatus türleri mevcuttur. Göç eden kuşlar kenelerin bölgeler arasında yayılışından büyük ölçüde sorumludur.



921 KENE TÜRÜ İNSAN VE HAYVANLARA 800 PATOJENİ BULAŞTIRIR

LARVASİTLER

BA-METOPRIN 100 EC

Ürün içerik

S-Methoprene %10 (a/h)

Formülasyon şekli

Emülsiyon Konsantre (EC)

Ambalaj : 1 L, 5 L

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- Juvenil Hormon Analogu sıvı larvasit
- Belirtilen dozlarda kullanıldığında, hedef dışı canlılara zarar vermez.
- Normal gelişime müdahale eder, morfolojik değişikliklere neden olur.
- Uzun süre etkisini kaybetmez.
- Pupa evresinden önce kullanıma başlanmalıdır.

Hedef

Sivrisinek larva, Kronomid larva ve Karasinek larva mücadelesi için kullanılır.

STOK ADI

Ba-Metoprin 100 EC 5 L



4



128



Kullanma şekli:

ZARARLI TÜRÜ	UYGULAMA ALANI	DOZ/GR	KARIŞIM ORANI	UYGULAMA ORANI	UYGULAMA ŞEKLİ
Sivrisinek Larva	Temiz Sularda	20 g.a.i./ha	1 Lt ürün+99 Lt su	20 Lt karışım/Ha	Pulverizatör ile Spreyleme
Kronomid Larva		20 g.a.i./ha			
Karasinek Larva	Çöplük/Gübrelik	0,1 g.a.i./m ²	50 ml ürün+149,95 Lt su	3 Lt karışım/m ²	

LARVASİTLER

BAVOXYFEN 250 EW

Ürün içerik

Pyriproxyfen %25 (a/h)

Formülasyon şekli

Su içinde Yağ Emülsiyon (EW)

Ambalaj : 1 L, 5 L

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- Juvenil Hormon Analogu sıvı larvasittir.
- Belirtilen dozlarda kullanıldığında, hedef dışı canlılara zarar vermez.
- Balık bulunan habitatlarda dahi güvenle kullanılabilir.
- Pupa evresinden önce kullanıma başlanmalıdır.
- Direnç gelişimi zor ve etki süresi uzundur.
- Su ile kolay karışır

Hedef

Böcek Gelişim Düzenleyicisi (IGR) grubundan, sivrisinek, kronomid ve karasinek larva kontrolü amacıyla kullanılır.

STOK ADI

Bavoxyfen 200 EW 5 L



4



128



Kullanma şekli:

ZARARLI TÜRÜ	UYGULAMA ALANI	DOZ/GR	KARIŞIM ORANI	UYGULAMA ORANI	UYGULAMA ŞEKLİ
Sivrisinek Larva	Temiz Sularda	10 g.a.i./ha	1 Lt ürün+124 Lt su	5 Lt karışım/Ha	Pulvarizatör ile Spreyleme
Kronomid Larva	Temiz Sularda	10 g.a.i./ha	0,8 Lt ürün+99,2 Lt su		
Karasinek Larva	Çöplük/Gübrelik	0,05 g.a.i./m ²	20 ml ürün+99,98 Lt su	1 Lt karışım/m ²	

LARVASİTLER

BAVOXYFEN® 200 EC

Ürün içerik

Pyriproxyfen %20 a/h

Formülasyon şekli

Emülsiyon Konsantre (EC)

Ambalaj : 1 L, 5 L

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- Üçüncü nesil güvenilir sıvı larvasit
- Belirtilen dozlarda kullanıldığında, hedef dışı canlılara zarar vermez.
- Balık bulunan habitatlarda dahi güvenle kullanılabilir.
- Pupa evresinden önce kullanıma başlanmalıdır.
- Direnç gelişimi zor ve etki süresi uzundur.

Hedef

Sivrisinek, Karasinek ve Kronomid (Titreksinek) larva mücadelesi için kullanılır.

STOK ADI

Bavoxifen 200 EC 5 L



4



128



Kullanma şekli:

ZARARLI TÜRÜ	UYGULAMA ALANI	DOZ/GR	KARIŞIM ORANI	UYGULAMA ORANI	UYGULAMA ŞEKLİ
Sivrisinek Larva	Temiz Sularda	10 g.a.i./ha	1 Lt ürün+99 Lt su	5 Lt karışım/Ha	Pulvarizatör ile Spreyleme
Kronomid Larva (Titreksinek)		10 g.a.i./ha			
Karasinek Larva	Çöplük/Gübrelik	0,05 g.a.i./m²	50 ml ürün+599,95 Lt su	3 Lt karışım/m²	

LARVASİTLER

DİFLUBAN® %48 SC

Ürün içerik

Diflubenzuron 480 g/L

Formülasyon şekli

Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj : 5 L HDPE Bidon

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- Kitin Sentezi İnhibitörü sıvı larvasit
- Güneş ışığına karşı dayanıklılık
- Karasinek larvalarına karşı güçlü larvasidal ve ovisidal etkinlik (1)
- Uygulamadan 24 saat sonra % 90'a varan hızlı larval ölüm ve 30 gün kalıcı etkinlik (2)
- Standart pülverizatörlerle kullanım

Hedef

Karasinek larva mücadelesi için kullanılır.

STOK ADI

Bavoxyfen 200 EC 5 L



4



128



Kullanma şekli:

ZARARLI TÜRÜ	UYGULAMA ALANI	DOZ/GR	KARIŞIM ORANI	UYGULAMA ORANI	UYGULAMA ŞEKLİ
Karasinek Larva	Çöplük/Gübrelik	0,5 g.a.i./m ²	208 ml ürün+400 Lt su	2 Lt karışım/m ²	Pulvarizatör
Karasinek Larva	Çok kuru gübrelik alanlar	0,5 g.a.i./m ²	208 ml ürün+1000 Lt su	5 Lt karışım/m ²	

(1) Yumurta içindeki embriyoyu öldürücü etki (Mir. S. Mulla ve ark. Muhtelif yayınları)

(2) WHOPES, WHO Guidelines for drinking quality water. Version Sept. 2006

UÇKUN ÜRÜNLERİ

BACYPHENOTHRİN 450 EC

Ürün içerik

Cyphenothrin	300 g/L
Tetramethrin	50 g/L
PBO	100 g/L

Formülasyon şekli

Emülsiyon Konsantre (EC)

Ambalaj : 1 L, 5 L

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- Piretroit grubu sıvı insektisit
- Temas ve mide zehiri etkilidir
- Biodegradable, doğada parçalanarak çevrede birikim yapmaz
- Memeli vücudunda birikmeden dışarı atılır.

Hedef

Sivrisinek ve Karasinek ergin mücadelesi için kullanılır.

STOK ADI

Bacypenothrin 450 EC 5 L



4



128



Kullanma şekli:

ZARARLI TÜRÜ	UYGULAMA ALANI	DOZ/GR	KARIŞIM ORANI	UYGULAMA ORANI	UYGULAMA ŞEKLİ
Sivrisinek Ergin	Açık Alan	2 g.a.i./ha	1 Lt ürün+74 Lt su	0,5 Lt karışım/Ha	ULV
Karasinek Ergin		5 g.a.i./ha	1 Lt ürün+29 Lt su		

UÇKUN ÜRÜNLERİ

BAFENOTHRİN 450 EC

Ürün içerik

1-R Transphenothrin	300 g/L
Tetramethrin	50 g/L
PBO	100 g/L

Formülasyon şekli

Emülsiyon Konsantre (EC)

Ambalaj : 100 ml, 1L, 5L

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- İritasyon yapmayan, yüksek güvenilirlikte
- Belirtilen dozlarda kullanıldığında, hedef dışı canlılara zarar vermez.
- Sentetik piretroit grubu insektisit
- Akut ve temas etkili
- Biodegradable, doğada parçalanarak çevrede birikim yapmaz

Hedef

Sivrisinek ve Karasinek ergin mücadelesi için kullanılır.

STOK ADI

Bafenohtin 450 EC 5 L



4



128



Kullanma şekli:

ZARARLI TÜRÜ	UYGULAMA ALANI	DOZ/GR	KARIŞIM ORANI	UYGULAMA ORANI	UYGULAMA ŞEKLİ
Sivrisinek Ergin	Açık Alan	5 g.a.i./ha	1 Lt ürün+29 Lt su	0,5 Lt karışım/Ha	ULV
Karasinek Ergin		5 g.a.i./ha			

UÇKUN ÜRÜNLERİ

CYPERMECTİN® 100 EC

Ürün içerik

Cypermethrin 100 g/L g/L

Formülasyon şekli

Emülsiyon Konsantre (EC)

Ambalaj : 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1L, 5L

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- Güçlü öldürücü etki
- Ekonomik
- Kolay sulandırılan insektisit
- Biodegradable, doğada parçalanarak çevrede birikim yapmaz

Hedef

Sivrisinek ve Karasinek mücadelesi için kullanılır.

STOK ADI

Cypermectin 100 EC 5 L



4



128



Kullanma şekli:

ZARARLI TÜRÜ	UYGULAMA ALANI	DOZ/GR	KARIŞIM ORANI	UYGULAMA ORANI	UYGULAMA ŞEKLİ
Sivrisinek	Açık Alan	1 g.a.i./ha	1 Lt ürün+49 Lt su	1 Lt karışım/Ha	ULV
Karasinek		2 g.a.i./ha	1 Lt ürün+24 Lt su		

UÇKUN ÜRÜNLERİ

CYPERMECTİN® 175 EC

Ürün içerik

Cypermethrin	100 g/L
Tetramethrin	15 g/L
PBO	60 g/L

Formülasyon şekli

Emülsiyon Konsantre (EC)

Ambalaj : 50 ml, 100 ml, 1L, 5L

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- Güçlü öldürücü, düşürücü ve sinerjist etki
- Ekonomik
- ideal karışım oranları
- Kolay sulandırılan insektisit
- Biodegradable, doğada parçalanarak çevrede birikim yapmaz

Hedef

Sivrisinek ve Karasinek mücadelesi için kullanılır.

STOK ADI

Cypermectin 175 EC 5 L



4



128



Kullanma şekli:

ZARARLI TÜRÜ	UYGULAMA ALANI	DOZ/GR	KARIŞIM ORANI	UYGULAMA ORANI	UYGULAMA ŞEKLİ
Sivrisinek	Açık Alan	1 g.a.i./ha	1 Lt ürün + 49 Lt su	0,5 Lt karışım/Ha	ULV
Karasinek		2 g.a.i./ha	0,5 Lt ürün + 24 Lt su		

UÇKUN ÜRÜNLERİ

PERMECTİN® 450 EC

Ürün içerik

Permethrin	300 g/L
Tetramethrin	50 g/L
PBO	100 g/L

Formülasyon şekli

Emülsiyon Konsantre (EC)

Ambalaj : 100 ml, 500 ml, 1 L, 5 L

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- Kolay sulandırılan insektisit
- Güçlü öldürücü, düşürücü ve sinerjist etkili
- İritasyon yapmayan formülasyon
- Biodegradable, doğada parçalanarak çevrede birikim yapmaz
- Ahır ve hayvan barınaklarında Hamamböceği ve kene mücadelesinde ani etkili çözüm

Hedef

Sivrisinek, karasinek, hamamböceği, kene mücadelesi için kullanılır.

STOK ADI

Permethrin 450 EC 5 L



4



128



Kullanma şekli:

ZARARLI TÜRÜ	UYGULAMA ALANI	DOZ/GR	KARIŞIM ORANI	UYGULAMA ORANI	UYGULAMA ŞEKLİ
Sivrisinek	Açık Alan	5 g.a.i./ha	1 L ürün+29 L su	0,5 Lt karışım/Ha	ULV
Karasinek Ergin		5 g.a.i./ha		0,5 Lt/Ha	
Sivrisinek	Boş Kapalı Alan	0,5 g.a.i./m²	50 ml ürün+1450 ml su	50 ml karışım/m²	Pulverizatör
Karasinek Ergin		0,0625 g.a.i./m²	10 ml ürün+2390 ml su		
Hamamböceği		0,125 g.a.i./m²	20 ml ürün+2380 ml su		
Kene Larva		0,1 g.a.i./m²	10 ml ürün+1490 ml su		

UÇKUN ÜRÜNLERİ

DELTAMECTİN® 325 EC

Ürün içerik

Deltamethrin 25 g/L
PBO 300 g/L

Formülasyon şekli

Emülsiyon Konsantre (EC)

Ambalaj : 5 L COEX Bidon

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- Kolay sulandırılan insektisit
- Ekonomik, uygulama maliyeti avantajlı
- Hızlı düşürücü etkili
- Tek izomere sahip aktif madde ile en güçlü biyolojik etkinlik
- Biodegradable, doğada parçalanarak çevrede birikim yapmaz

Hedef

Sivrisinek ve karasinek mücadelesi için kullanılır.

STOK ADI

Deltamectin 325 EC 5 L



4



128



Kullanma şekli:

ZARARLI TÜRÜ	UYGULAMA ALANI	DOZ/GR	KARIŞIM ORANI	UYGULAMA ORANI	UYGULAMA ŞEKLİ
Sivrisinek, Karasinek	Açık Alan	0,5 g.a.i./ha	1 L ürün +49 L su	1 L karışım/Ha	ULV
Sivrisinek	Kanalizasyon	1g.a.i./ha	1 L ürün + 249 L mazot	10 L karışım/Ha	TF-Sıcak Sisleme

UÇKUN ÜRÜNLERİ



MİCROSİN® EW

Ürün içerik

Cypermethrin	100 g/L
Tetramethrin	20 g/L
PBO	50 g/L

Formülasyon şekli

Emulsiyon Oil in Water (EW)

Ambalaj : 5 L COEX Bidon

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- ULV uygulamaları için en ideal formülasyon
- Kokusuz, leke yapmayan kalıcı etkili insektisit
- Su bazlı, solvent içermeyen formülasyon
- Hızlı düşürücü ve sinerjist etki
- Biodegradable, doğada parçalanarak çevrede birikim yapmaz.
- Avrupa Birliği'nde onaylı biyosidal ürün

Hedef

Sivrisinek, karasinek ve hamamböceği mücadelesi için kullanılır.

STOK ADI

Microsin EW 5 L



4



128



Kullanma şekli:

ZARARLI TÜRÜ	UYGULAMA ALANI	DOZ/GR	KARIŞIM ORANI	UYGULAMA ORANI	UYGULAMA ŞEKLİ
Sivrisinek	Açık Alan	1 g.a.i./ha	1 Lt ürün+49 Lt su	0,5 Lt karışım/Ha	ULV
Karasinek		2 g.a.i./ha	1 Lt ürün+24 Lt su		
Hamamböceği	Boş Kapalı Alan	0,05 g.a.i./m ²	50 ml ürün +4950 ml su	50 ml karışım/m ²	Pulverizatör

REZİDÜEL(YÜZEY) ÜRÜNLER

BA-MAX

Pump Sprey 400 ml

Ürün içerik

Permethrin	10 g/L
Tetramethrin	2,5 g/L
PBO	7,5 g/L

Formülasyon şekli

Sıvı Emülsiyon

Ambalaj : 200 ml, 400 ml, 5L

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- Sinerjist etkili, güçlü formülasyon
- Kullanıma hazır, pratik uygulama

Hedef

Sivrisinek, karasinek, hamamböceği, pire ve kene mücadelesi için spray ürün.

STOK ADI

Ba-Max Pump Sprey 400 ml



20



640



Kullanma şekli:

ZARARLI TÜRÜ	UYGULAMA ALANI	DOZ/GR	KARIŞIM ORANI	UYGULAMA ORANI	UYGULAMA ŞEKLİ
Sivrisinek Ergin	Boş kapalı alan sprey uygulama	0,5 g.a.i./m ²	Kullanıma hazır spray	50 ml ürün/m ²	Sprey Uygulaması
Karasinek Ergin		0,0625 g.a.i./m ²		6,25 ml ürün/m ²	
Hamamböceği, Karıncalar Ergin		0,125 g.a.i./m ²		12,5 ml ürün/m ²	
Pire Ergin		0,1 g.a.i./m ²		10 ml ürün/m ²	
Kene Larva	Mesken çevresi sprey uygulama	0,1 g.a.i./m ²			

REZİDÜEL(YÜZEY) ÜRÜNLER

ALFAMAX® SE

Ürün içerik

Alphacypermethrin 100 g/L
Tetramethrin 50 g/L
PBO 150 g/L

Formülasyon şekli

Süspo Emülsiyon (SE)

Ambalaj : 50 ml, 500 ml, 1 L,
5 L HDPE Bidon

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- Kokusuzdur, yüzeylerde leke bırakmaz.
- Biodegradable, çevrede birikim yapmaz.
- Hızlı düşürücü ve sinerjist etkili.

Hedef

Hamamböceği, sivrisinek, karasinek ve kene mücadelesi için kullanılır.

STOK ADI

Alfamax SE 50 mL
Alfamax SE 500 ml
Alfamax SE 5 L



100
20
4



3.600
720
128



Kullanma şekli:

ZARARLI TÜRÜ	UYGULAMA ALANI	DOZ/GR	KARIŞIM ORANI	UYGULAMA ORANI	UYGULAMA ŞEKLİ
Sivrisinek	Kapalı Alan Yüzey Uyg.	0,02 g.a.i./m ²	20 ml ürün+5 Lt su	5 L karışım /100 m ²	Pulverizatör
Karasinek		0,015 g.a.i./m ²	15 ml ürün+5 Lt su		
Hamamböceği	Mesken Çevresi yüzey Uyg.	0,03 g.a.i./m ²	30 ml ürün+5 Lt su		
Kene Larva		0,012 g.a.i./m ²	12 L ürün+5 Lt su		

REZİDÜEL(YÜZEY) ÜRÜNLER

BA-DELTA® SE

Ürün içerik

Deltamethrin	50 g/L
Tetramethrin	25 g/L
PBO	50 g/L

Formülasyon şekli

Süspo Emülsiyon (SE)

Ambalaj : 50 ml, 500 ml, 1000 ml,
5 L HDPE Bidon

Raf Ömrü : 18 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır. ††

Özellikleri

- Kokusuz, leke yapmayan uzun süre etkili
- Hızlı düşürücü ve sinerjist etkili
- Dirençli zararlıları da kontrol eder
- Su bazlı formülasyon
- Biodegradable, çevrede birikim yapmaz

Hedef

Sivrisinek, Karasinek ve
Hamamböceği mücadelesi
için kullanılır.

STOK ADI

Ba-Delta SE 50 ml	100	3.600
Ba-Delta SE 500 ml	20	720
Ba-Delta SE 5 L	4	128



Kullanma şekli:

ZARARLI TÜRÜ	UYGULAMA ALANI	DOZ/GR	KARIŞIM ORANI	UYGULAMA ORANI	UYGULAMA ŞEKLİ
Sivrisinek	Boş Kapalı Alan Yüzey Uygulama	0,025 g.a.i./m ²	50 ml ürün+4950 ml su	50 ml karışım/m ²	Pulverizatör
Karasinek		0,01 g.a.i./m ²	20 ml ürün+4980 ml su		
Hamamböceği		0,03 g.a.i./m ²	60 ml ürün+4940 ml su		
Altılık Böceği		0,016 g.a.i./m	32 ml ürün +4968 ml		

REZİDÜEL(YÜZEY) ÜRÜNLER



MAKSi® SC

Ürün içerik

Alphacypermethrin 60 g/L

Formülasyon şekli

Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj : 50 ml, 5 L HDPE Bidon

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- Gıda üretilen alanlar dahil olmak üzere hassas alanlarda güvenli kullanım
- Su bazlı, solvent içermeyen formülasyon
- Güçlü öldürücü etki
- Kokusuz, leke yapmayan etkili insektisit
- Biodegradable, doğada parçalanarak çevrede birikim yapmaz.
- Avrupa Birliği'nde onaylı biyosidal ürün

Hedef

Sivrisinek, karasinek ve hamamböceği mücadelesi için kullanılır.

STOK ADI

Maksi SC 50 ml
Maksi SC 5 L



100
4



3.600
128



Kullanma şekli:

ZARARLI TÜRÜ	UYGULAMA ALANI	DOZ/GR	KARIŞIM ORANI	UYGULAMA ORANI	UYGULAMA ŞEKLİ
Sivrisinek Ergin	Kapalı Alan Yüzey Uygulama	0,021 g.a.i./m ²	35 ml ürün+9965 ml su	100 ml karışım/m ²	Pulverizatör
Karasinek Ergin		0,015 g.a.i./m ²	25 ml ürün+9975 ml su		
Hamamböceği		0,03 g.a.i./m ²	50 ml ürün+9950 ml su		

REZİDÜEL(YÜZEY) ÜRÜNLER



EFFECT MICROTECH® CS

PATENTLİ YENİ MİKROKAPSÜL İNSEKTİSİT

Ürün içerik

Permethrin	80 g/L
Tetramethrin	40 g/L
PBO	80 g/L

Formülasyon şekli

Kapsül Süspansiyon (CS)

Ambalaj : 100 ml (kutulu), 500 ml,
1 L ve 5 L HDPE Bidon

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- Patentli formülasyondur.
- İnsektisidal aktif madde kapsül kabuğa doğru yavaşça salınır.
- Yavaş salınım ürünün etkinliğini artırır.
- Micro kapsüller 5-10 µm büyüklüğündedir, polimer bariyerlidir
- Litrede yaklaşık 200 milyon kapsül
- Tetramethrin’in % 2 si kapsüller arasındaki boşlukta olduğundan hızlı ani etkiye sahiptir.
- Temas etkili, yüzeylerde etkisi uzun süre devam eder.
- Aktif maddenin % 99.5 i mikrokapsül içindedir.

Hedef

Hamamböceği, karınca, sivrisinek, karasinek ve kene mücadelesi için kullanılır.

STOK ADI

Effect Microtech CS 100 ml	50	3.000
Effect Microtech CS 500 ml	20	720
Effect Microtech CS 5 L	4	128



Kullanma şekli:

ZARARLI TÜRÜ	UYGULAMA ALANI	DOZ/GR	KARIŞIM ORANI	UYGULAMA ORANI	UYGULAMA ŞEKLİ
Hamamböceği, Karınca Ergin	Boş Kapalı Alan	0,125 g.a.i./m ²	156,25 ml ürün +4843,75 ml su	50 ml karışım/m ²	Pulverizatör
Sivrisinek Ergin		0,0625 g.a.i./m ²	78,125 ml ürün 4921,875 ml su		
Karasinek Ergin		0,0625 g.a.i./m ²			
Kene, larva	Boş Kapalı Alan ve Mesken Çevresi	0,1 g.a.i./m ²	125 ml ürün+ 4875 ml su	50 ml karışım/m ²	

REZİDÜEL(YÜZEY) ÜRÜNLER



PIRETRUM MICRO® ME

Ürün içerik

Doğal Piretrin	15 g/L
PBO	115 g/L

LD50 Değeri

Piretrin Akut Oral LD₅₀ sıçan 750 mg/Kg

Formülasyon şekli

Mikro Emulsiyon (ME)

Ambalaj : 1 L

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- Güçlü biyolojik etki
- Dirençli zararlıları kontrol eder
- Biodegradable, yüzeyde kalıntı bırakmaz, uygulamayı takiben kısa sürede parçalanır
- Gıda üretim ve sağlık kurumları dahil hassas alanlarda güvenli kullanım
- Su bazlı, kokusuz, solvent içermez
- AB BPD yönetmeliğine uygun ürün

Hedef

Sivrisinek, karasinek, hamamböceği, kene mücadelesinde kullanılır.

Depo zararlılarına karşı, gıda işletmeleri, restoranlar, gıda depoları, sağlık kuruluşları, kreşler ve huzur evlerinde sinerjist etkili güçlü doğal çözüm sağlar.

STOK ADI

Piretrum Micro 1 L



4



128



Kullanma şekli:

ZARARLI TÜRÜ	UYGULAMA ALANI	DOZ/GR	KARIŞIM ORANI	UYGULAMA ORANI	UYGULAMA ŞEKLİ
Sivrisinek Ergin	Boş Kapalı Alan	0,01125 g.a.i./m ²	75 ml ürün+ 9925 ml su	100 ml karışım/m ²	Pulverizatör
Karasinek Ergin		0,01125 g.a.i./m ²			
Hamamböceği Ergin		0,01875 g.a.i./m ²	125 ml ürün+ 9875 ml su		
Kene Larva	Mesken çevresi yüzey uygulama	0,01 g.a.i./m ²	66,67 ml ürün+ 933,33 ml su		

JEL ÜRÜNLER



BAVET POSEİDON-F

Ürün içerik

Fipronil 0,5 g/L

Formülasyon şekli

Jel Formülasyon(GD)

Ambalaj : 5 g, 20 g, 35 g

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- Yüksek derecede çekici formülasyon
- Domino etkili jel ürün

Kullanım Şekli

Kapalı alanlarda hamamböceği ve karıncaların görüldüğü alanlara uygulanır. Uygulama yapılacak alan temizlenir ve hamamböceği için m²'ye 2 damla, karıncalar için m²'ye 1 damla Poseidon-F uygulanır. Işık yoğunluğunun az ve temiz alanlara uygulanmalıdır. Hamamböceklerinin görüldüğü sıcak ve nemli yerler, mutfak, banyo, bodrum, küvet, giysi sepetleri, mutfak buhar bacaları, kapı pervaz araları, süpürgelik araları, mobilya arkaları, duvar çatlakları, doğalgaz olmayan alanlarda yakacak alanları vb. bölgelere evcil hayvanlar ve çocukların ulaşamayacağı şekilde uygulanmalıdır.

Hedef

Hamamböceği ve karınca mücadelesi için jel ürün.

STOK ADI

Poseidon-F 5 gr
Poseidon-F 35 gr



36
20



1296
4.000



ZARARLI TÜRÜ	UYGULAMA ALANI	DOZ/GR	KARIŞIM ORANI	UYGULAMA ORANI	UYGULAMA ŞEKLİ
Hamamböceği	Kapalı Alan	2 damla=0,06 g		2 damla/m ²	
Karınca	Yüzey Uygulama	1 damla=0,03 g		1 damla/m ²	Şırınga ile damla uygulama

RODENTİSİTLER

ZAGOR® PASTA



Ürün İçerik

Brodifacoum % 0.005
Denatonium Benzoate (Bitrex) % 0.001
Cezbedici yemler ve dolgu maddeleri ile
100 g'a tamamlanır.

Ambalaj : 80 g karton kutu içinde,
100 g, 1 Kg, 5 kg, 10 kg.

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- Her Poşet 10 g dır.
- Mükemmel öldürücü etki
- En kaliteli gıdalar ile hazırlanmış çekici ve güçlü aromalı
- Fare ve sıçanların su ihtiyacını karşılayarak tam ve kesin etki
- Bitrex ile hedef dışı canlıların tüketmesi engellenmiş, güvenli
- Rutubetli ortamlarda da kullanılabilme

Kullanma şekli ve dozu

Fare mücadelesi için 20-50 g, sıçan mücadelesi için 50-150 g olacak şekilde özel istasyonlarda kullanılmalıdır.

Hedef

Fare ve sıçanlar için dayanılmaz lezzet, tek dozda ölüm Türkiye'nin II. jenerasyon, etkin madde içeren ilk pasta formülasyonu rodentisiti. Arttırılmış lezzet ve koku ile fare ve sıçanlar tarafından kolayca bulunabilen yumuşak pasta formülasyonu.

STOK ADI

Zagor Pasta (20x500g) 10 kg
Zagor Pasta 80 g



1
100



32
2.000



Kullanma alanları

Binalarda, tarımsal ürün depolarında, değirmenlerde, evlerde ve çevresinde, restoranlarda, özel ve resmi kuruluşlarda, askeri birliklerde, sanayi ve ticari kuruluşlarda, uçak, gemi, tren gibi taşıt araçlarında, limanlarda kullanılabilir.

ZAGOR® MUM BLOK



Ürün İçerik

Brodifacoum % 0.005
Denatonium Benzoate (Bitrex) % 0.001
Cezbedici yemler ve dolgu maddeleri ile
100 g'a tamamlanır.

Ambalaj : 100 g PE poşette, 5 kg, 10 kg,

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- Her Blok 20 g ağırlığında,
- En ideal parafin oranı
- Tek dozda ölüm,
- Bitrex ile hedef dışı canlıların tüketmesi engellenmiş, güvenli
- Islak ve rutubetli ortamlar için ideal formülasyon
- Tarla, bahçe ve açık alanlar için uygun ürün
- En kaliteli gıdalar ile hazırlanmış çekici ve güçlü aromalı

Kullanma şekli ve dozu

Zagor Mum Blok çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı şekilde kullanılmalıdır. Kanalizasyon ve atık su sistemlerinde tel ile bağlanarak uygulanır. Kümeslerde veya hayvan barınaklarında hayvanların ulaşamayacağı yerlere tel veya çivi ile sabitlenerek kolayca uygulanır. Fare mücadelesi için 1-2 blok (3-5 m aralıklarla 20-40 g), sıçan mücadelesi için 3-5 blok (5-10 m aralıklarla 60-100 g) konulmalıdır.

Hedef

Fare ve sıçan mücadelesi için kullanıma hazır mum blok. Islak ve rutubetli ortamlar için ideal formülasyon.

STOK ADI

Zagor Mum Blok (20x500g) 10 kg
Zagor Mum Blok 100 g



1
100



32
2.000



Kullanma alanları

Özellikle ıslak ve rutubetli ortamlar için ideal bir formülasyondur. Binalar ve tarımsal ürün depoları, değirmenler, evler ve çevresinde, restoranlarda, özel ve resmi kuruluşlarda, askeri birliklerde, sanayi ve ticari kuruluşlarda, uçak, gemi, tren gibi taşıt araçlarında, limanlarda kullanılabilir.

RODENTİSİTLER

MEGALON® PASTA



Ürün İçerik

Bromadiolone % 0.005
Denatonium Benzoate (Bitrex) % 0.001
Cezbedici yemler ve dolgu maddeleri ile
100 g'a tamamlanır.

Ambalaj : 80 g karton kutu içinde,
100 g, 500 g, 5 kg, 10 kg,

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- Her Poşet 10 g dır.
- Güçlü tek doz etki
- Dirençli rodentleri de kontrol eder
- Bitrex ile hedef dışı canlıların tüketmesi engellenmiş, güvenli
- AB BPD yönetmeliğine uygun ürün

Kullanma şekli ve dozu

Çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı özel istasyonlar içinde kullanılmalıdır. Kanalizasyon ve atık su sistemlerinde tel ile bağlanarak uygulanır. Kümeslerde veya hayvan barınaklarında hayvanların ulaşamayacağı yerlere tel veya çivi ile sabitlenerek kolayca uygulanır. Fare mücadelesi için 2-3 poşet (20-30 g), sıçan mücadelesi için 5-10 poşet (50-100 g) konulmalıdır.

Hedef


Fare ve sıçanlara yeni lezzetler, tek dozda ölüm
Fare ve sıçan mücadelesi için kullanıma hazır pasta yem.
Arttırılmış lezzet ve koku ile kolayca bulunabilen
yumuşak pasta formülasyon.

STOK ADI

Megalon Pasta (20x500g) 10 kg
Megalon Pasta 80 g



1



32

100

1.500



Kullanma alanları

Binalar, tarımsal ürün depoları, değirmenler, evler ve çevresinde, restoranlarda, özel ve resmi kuruluşlarda, askeri birliklerde, sanayi ve ticari kuruluşlarda, uçak, gemi, tren gibi taşıt araçlarında, limanlarda kullanılabilir.

MEGALON® MUM BLOK



Ürün İçerik

Bromadiolone % 0.005
Denatonium Benzoate (Bitrex) % 0.001
Cezbedici yemler ve dolgu maddeleri ile
100 g'a tamamlanır.

Ambalaj : 80 g PE poşette (kutulu),
100 g, 5 kg, 10 kg,

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- Her Blok 20 g ağırlığında,
- Güçlü tek doz etki
- Dirençli zararlıları kontrol eder
- Bitrex ile hedef dışı canlıların tüketmesi engellenmiş, güvenli
- AB BPD yönetmeliğine uygun ürün

Kullanma şekli ve dozu

Çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı özel istasyonlar içinde kullanılmalıdır. Kanalizasyon ve atık su sistemlerinde tel ile bağlanarak uygulanır. Kümeslerde veya hayvan barınaklarında hayvanların ulaşamayacağı yerlere tel veya çivi ile sabitlenerek kolayca uygulanır. Fare mücadelesi için 1-2 blok (20-40 g), sıçan mücadelesi için 3-5 blok (60-100 g) lık konulmalıdır.

Hedef


Tek dozda ölüm
Fare ve sıçan mücadelesi için kullanıma hazır mum blok.
Islak ve rutubetli ortamlar için ideal formülasyon.

STOK ADI

Megalon M.Blok (20x500g) 10kg
Megalon M.Blok 80 g



1



32

100

1.500



Kullanma alanları

Binalar, tarımsal ürün depoları, değirmenler, evler ve çevresinde, restoranlarda, özel ve resmi kuruluşlarda, askeri birliklerde, sanayi ve ticari kuruluşlarda, uçak, gemi, tren gibi taşıt araçlarında, limanlarda kullanılabilir.

RODENTİSİTLER

NOCURAT® PASTA



Ürün İçerik

Difenacoum % 0.005
Denatonium Benzoate (Bitrex) % 0.001
Cezbedici yemler ve dolgu maddeleri ile
100 g'a tamamlanır.

Ambalaj : 80 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- Her Poşet 10 g dır.
- Mükemmel öldürücü etkinlik
- Pasta formülasyonu ile en kaliteli ve cezbedici gıdalarla hazırlanmış rodentisit
- Fare ve sıçanların su ihtiyacını karşılayarak tam ve kesin etki
- Tek dozda öldürücü etki
- Bitrex ile hedef dışı canlıların tüketmesi engellenmiş, güvenli
- Rutubetli ortamlarda da kullanılabilir

Kullanma şekli ve dozu

Nocurat pasta çocukların, ehliyetsiz kişilerin, evcil ya da yabani hayvanların ulaşamayacağı özel istasyonlar içinde kullanılmalıdır. Kanalizasyon sistemlerine, hayvan barınaklarına tel veya çivi ile sabitlenerek kolayca uygulanır. Fare mücadelesi için 20-50 g, sıçan mücadelesi için 50-150 g olacak şekilde özel istasyonlarda kullanılmalıdır.

Hedef

Fare ve sıçanlara yeni lezzetler, tek dozda ölüm Arttırılmış lezzet ve koku ile kolayca bulunabilen yumuşak pasta formülasyon.

STOK ADI

Nocurat Pasta (20x500g) 10 kg
Nocurat Pasta 100 g



1
100



32
2.000



Kullanma alanları

Binalar, tarımsal ürün depoları, değirmenler, evler ve çevresinde, restoranlarda, özel ve resmi kuruluşlarda, askeri birliklerde, sanayi ve ticari kuruluşlarda, uçak, gemi, tren gibi taşıt araçlarında, limanlarda kullanılabilir.

NOCURAT® MUM BLOK



Ürün İçerik

Difenacoum % 0.005
Denatonium Benzoate (Bitrex) % 0.001
Cezbedici yemler ve dolgu maddeleri ile
100 g'a tamamlanır.

Ambalaj : 100 g, 5 kg, 10 kg

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- Her Blok 20 g ağırlığında,
- Islak ve rutubetli ortamlar için ideal formülasyon
- En ideal parafin oranı
- Bitrex ile hedef dışı canlıların tüketmesi engellenmiş, güvenli
- En kaliteli ve çekici gıdalar ile hazırlanmış güçlü aromalı rodentisit

Kullanma şekli ve dozu

Nocurat Mum Blok çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı özel istasyonlar içinde kullanılmalıdır. Kanalizasyon ve atık su sistemlerinde tel ile bağlanarak uygulanır. Kümelerde veya hayvan barınaklarında hayvanların ulaşamayacağı yerlere tel veya çivi ile sabitlenerek kolayca uygulanır. Fare mücadelesi için 1 blok (20 g), sıçan mücadelesi için 3 blok (60 g) konulmalıdır.

Hedef

Tek dozda ölüm
Fare ve sıçan mücadelesi için kullanıma hazır mum blok. Islak ve rutubetli ortamlar için ideal formülasyon.

STOK ADI

Nocurat M.Blok (20x500g) 10 kg
Nocurat Mum Blok 100 g



1
100



32
2.000



Kullanma alanları

Binalar, tarımsal ürün depoları, değirmenler, evler ve çevresinde, restoranlarda, özel ve resmi kuruluşlarda, askeri birliklerde, sanayi ve ticari kuruluşlarda, uçak, gemi, tren gibi taşıt araçlarında, limanlarda kullanılabilir.

RODENTİSİTLER

FACORAT® PELLET



Ürün İçerik

Brodifacoum % 0.005
Denatonium benzoat (Bitrex) % 0.001
Cezbedici yemler ve dolgu maddeleri ile
100 g'a tamamlanır.

Ambalaj : 80 g karton kutu içinde,
100 g, 500 g, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- En öldürücü etkin madde içeren rodentisit
- Tüm fare ve sıçan türlerine karşı öldürücü etkili
- Fare ve sıçanlar için cezbedici en kaliteli gıdalarla hazırlanmış pellet formülasyon
- Bitrex ile hedef dışı canlıların tüketmesi engellenmiş, güvenli
- Fare ve sıçanların kemirme ihtiyacını giderecek mükemmel pellet ürün

Kullanma şekli ve dozu

Yağmur, rutubet gibi hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde özel istasyonlar içinde kullanılmalıdır. Fare mücadelesi için 15-30 g'lık, sıçan mücadelesi için 50-100 g'lık kümeler halinde konulmalıdır.

Hedef

Fare ve sıçan mücadelesi için kullanıma hazır pellet.

STOK ADI

Facorat Pellet (20x500g) 10 kg
Facorat Pellet 80 g



1
100



32
2.000



Kullanma alanları

Kırsal alanlarda: Binalar, tarımsal ürün depoları, değirmenlerde.

Kentlerde: Evler ve çevresinde, restoranlarda, özel ve resmi kuruluşlarda, askeri birliklerde, sanayi ve ticari kuruluşlarda, uçak, gemi, tren gibi taşıt araçlarında, limanlarda kullanılabilir.

NOT: Çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı özel istasyonlar içinde kullanılmalıdır

RODİMUR® PELLET



Ürün İçerik

Difenacoum % 0.005
Denatonium Benzoate (Bitrex) % 0.001
Cezbedici yemler ve dolgu maddeleri ile
100 g'a tamamlanır.

Ambalaj : 80 g karton kutu içinde,
100 g, 500 g, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Raf Ömrü : 24 ay

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdır.

Özellikleri

- Bütün fare ve sıçan türlerine karşı öldürücü etkili
- Fare ve sıçanlar için cezbedici, en kaliteli gıdalarla hazırlanmış pellet formülasyon
- Bitrex ile hedef dışı canlıların tüketmesi engellenmiş, güvenli
- Fare ve sıçanların kemirme ihtiyacını giderecek mükemmel pellet ürün

Kullanma şekli ve dozu

Yağmur, rutubet gibi hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde özel istasyonlar içinde kullanılmalıdır. Fare mücadelesi için 15-30 g'lık, sıçan mücadelesi için 50-100 g'lık kümeler halinde konulmalıdır.

Hedef

Fare ve sıçanlara karşı tek dozda ölüm.

STOK ADI


Rodimur Pellet (20x500g) 10 kg
Rodimur Pellet 80 g



1
100



32
2.000



Kullanma alanları

Kırsal alanlarda: Binalar, tarımsal ürün depoları, değirmenler.

Kentlerde: Evlerde ve çevresinde, restoranlarda, özel ve resmi kuruluşlarda, askeri birliklerde, sanayi ve ticari kuruluşlarda, uçak, gemi, tren gibi taşıt araçlarında, limanlarda kullanılabilir.

NOT: Çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı özel istasyonlar içinde kullanılmalıdır.

BAVET BİYOSİDAL ÜRÜNLER VE KULLANILDIĞI ZARARLILAR

Ürün Adı	Ürün Bileşimi	Larva Sivrisinek	Larva Karasinek	Larva Kronomid	Ergin Sivrisinek	Ergin Karasinek	Hamam Böceği	Kene	Pire	Karınca
Larvasitler										
Ba-Metoprin 100 EC	S-methoprene 100 g/L									
Bavoxyfen 200 EC	Pyriproxyfen 200 g/L									
Bavoxyfen 250 EW	Pyriproxyfen 250 g/L									
Difluban % 48 SC	Diflubenzuron 480 g/L									
Alan Spreyi İnsektisitler										
Bacphenothrin 450 EC	Cyphenothrin 300 g/L Tetramethrin 50 g/L PBO 100 g/L									
Bafenothrin 450 EC	1R-Transphenothrin 300 g/L Tetramethrin 50 g/L PBO 100 g/L									
Cypermectin 100 EC	Cypermethrin 100 g/L									
Cypermectin 175 EC	Cypermethrin 100 g/L Tetramethrin 15 g/L PBO 60 g/L									
Deltamectin 325 EC	Deltamethrin 25 g/L PBO 300 g									
Microsin EW	Cypermethrin 100 g/L Tetramethrin 20 g/L PBO 50 g/L									
Permethrin 450 EC	Permethrin 300 g/L Tetramethrin 50 g/L PBO 100 g/L									
Kalıcı (rezidüel) etkili insektisitler										
Alfamax SE	Alphacypermethrin 100 g/L Tetramethrin 50 g/L PBO 150 g/L									
Ba-Delta SE	Deltamethrin 50 g/L Tetramethrin 25 g/L PBO 50 g/L									
Ba-Max Pump Sprey	Permethrin 1 g/L Tetramethrin 0,025 g/L PBO 0,075 g/L									
Effect Microtech CS	Permethrin 80 g/L Tetramethrin 40 g/L PBO 80 g/L									
Maksi SC	Alphacypermethrin 60 g/L									
Piretrum Micro ME	Doğal Pyretrin 15 g/L PBO 115 g/L									
Poseidon-F	Fipronil 0,5 g/L									
Rodentisitler										
Facorat Pellet	Brodifacoum %0,005 Denatonium Benzoat(Bitrex) %0,001 Cezbedici yemler ve dolgu maddeleri ile 100 g'a tamamlanır.									
Megalon Mum Blok	Bromadiolone %0,005 Denatonium Benzoat(Bitrex) %0,001 Cezbedici yemler ve dolgu maddeleri ile 100 g'a tamamlanır.									
Megalon Pasta	Bromadiolone %0,005 Denatonium Benzoat(Bitrex) %0,001 Cezbedici yemler ve dolgu maddeleri ile 100 g'a tamamlanır.									
Nocurat Mum Blok	Difenacoum %0,005 Denatonium Benzoat(Bitrex) %0,001 Cezbedici yemler ve dolgu maddeleri ile 100 g'a tamamlanır.									
Nocurat Pasta	Difenacoum %0,005 Denatonium Benzoat(Bitrex) %0,001 Cezbedici yemler ve dolgu maddeleri ile 100 g'a tamamlanır.									
Rodimur Pellet	Difenacoum %0,005 Denatonium Benzoat(Bitrex) %0,001 Cezbedici yemler ve dolgu maddeleri ile 100 g'a tamamlanır.									
Zagor Mum Blok	Brodifacoum %0,005 Denatonium Benzoat(Bitrex) %0,001 Cezbedici yemler ve dolgu maddeleri ile 100 g'a tamamlanır.									
Zagor Pasta	Brodifacoum %0,005 Denatonium Benzoat(Bitrex) %0,001 Cezbedici yemler ve dolgu maddeleri ile 100 g'a tamamlanır.									





Bavet İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (İTOSB) 12.Cad No:8 34959 Tepeören - Tuzla / İstanbul

Tel: +90 216 593 37 40 (pbx) Fax: +90 216 593 37 41

www.bavet.com.tr