



Megamast DC

Kuru dönemdeki ineklerde 10 hafta süresince antibakteriyel etki

Streptokok, Stafilokok, *Corynebacterium* ve *Escherichia coli* gibi Gram pozitif ve Gram negatif bakterilerden ileri gelen mastitisle ilişkili enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Megamast DC

Meme İçi Süspansiyon
48 tüp içeren kova

Her 5 g üründe;

Kloksasilin (benzatin halinde) 600 mg
Ampisilin (trihidrat halinde) 300 mg



TEK UYGULAMA

- ✓ Laktasyonun son sağımından hemen sonra mevcut mastitisi tedavi etmek ve kuru dönemde başka enfeksiyonlara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır.
- ✓ Son sağımdan sonra her bir memeye bir tüp olarak, meme ucu temizlendikten ve dezenfekte edildikten sonra uygulanmalıdır.
- ✓ Enjektörün ucu meme ucu deliğine yerleştirilir, fakat içine sokulmaz. Piston itildiğinde ürün meme ucundan meme dokusuna ulaşır.



Bavet İlaç A.Ş.

İTOSB (İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi) 12. Cadde No:8, 34959
Tepedören, Tuzla, İstanbul TÜRKİYE T: 0216 593 37 40 F: 0216 593 37 41

www.bavet.com.tr

