

Sinerjik Etki

Levamisol ile Antinematodal etki + Oksiklozanid ile karaciğer keleklerine karşı etki



Ticari şekli: 1Lt


Mizolanid

Oral Süspansiyon
30 mg Levamisol HCl
60 mg Oksiklozanid

Siğir ve koyunlarda aşağıda yer alan gastrointestinal ve pulmoner nematodları ve erişkin karaciğer kelebeği enfestasyonlarının tedavisi ve kontrolünde kullanılır.


Trichostrongylus spp., *Cooperia* spp., *Ostertagia* spp. (inhibe larvalar hariç), *Haemonchus* spp., *Nematodirus* spp., *Bunostomum* spp., *Oesophagostomum* spp., *Chabertia* spp.

Akciğer kurdu




Dictyocaulus spp.

Gastrointestinal kurtlar



Haemonchus contortus



Nematodirus spp.



Cooperia spp.

Karaciğer kelekleri



Fasciola spp.

Pratik Doz

Siğirlarda her 100 kg vücut ağırlığı için 25 ml Mizolanid Oral Süspansiyon
Koyunlarda her 10 kg vücut ağırlığı için 2,5 ml Mizolanid Oral Süspansiyon



Bavet İlaç A.Ş.

İTOSB (İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi) 12. Cadde No:8, 34959
Tepeören, Tuzla, İstanbul TÜRKİYE T: 0216 593 37 40 F: 0216 593 37 41

www.bavet.com.tr

